

緊急時対応経過記録表

1	誤食した時間	年 月 日 () 時 分				備考
2	最初に気付いた時間	気づいた人： 時 分				
	訴えのあった時間	対応した人： 時 分				
3	食べたもの・量					
4	症状	軽度のかゆみ、数個のじんま疹、部分的な赤み			時 分	
		目のかゆみ、充血、口の中の違和感、唇の腫れ、くしゃみ、鼻水、鼻づまり			時 分	
		軽いお腹の痛み（がまんできる）			時 分	
		吐き気			時 分	
		強いかゆみ、全身に広がるじんま疹、全身が真っ赤			時 分	
		顔全体の腫れ、まぶたの腫れ			時 分	
		中等度のお腹の痛み			時 分	
		1～2回のおう吐			時 分	
		1～2回の下痢			時 分	
		数回の軽い咳			時 分	
		持続する強い（がまんできない）お腹の痛み 繰り返し吐き続ける			時 分	
のどや胸が締め付けられる、声がかすれる、犬が吠えるような咳、息がしにくい、持続する強い咳込み、ゼーゼーする呼吸			時 分			
ぐったり、意識もうろう、尿や便を漏らす、脈が触れにくいまたは不規則、唇や爪が青白い			時 分			
5	バイタルサイン	時間	時 分	時 分	時 分	備考
		脈拍	回/分 触れる 触れない	回/分 触れる 触れない	回/分 触れる 触れない	乳児 120～140回/分 幼児 90～120回/分
		呼吸状態	回/分 荒い ふつう	回/分 荒い ふつう	回/分 荒い ふつう	乳児 40～30回/分 幼児 30～20回/分
		体温	℃	℃	℃	
6	処置・経過	・口の中のものを取り除く・うがいをする・手を洗う			時 分	
		薬の内服・吸入（内容)			時 分	
		エピペン準備「持ってきてください」			時 分	
		エピペン接種（誰が：)			時 分	
		救急車要請			時 分	
		救急車到着			時 分	
		心肺蘇生 ・ AED			時 分	
		家庭連絡者（)	時 分	医師連絡者（)	時 分	
記載者名						