



定期・任意予防接種スケジュール

2012年1月1日現在

		公費対象	2 カ 月	3 カ 月	4 カ 月	5 カ 月	6～8カ月	9～11カ月	12 カ 月	15 カ 月	18 カ 月	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10歳以上		
予 防 接 種 法	定期一類疾病予防接種	DPT(三種混合)	不活化	○	①	②	③		④			(7.5歳まで)										
		BCG	生	○		① (4か月健診時)		(注1)														
		ポリオ	生	○				①		②		(7.5歳まで)										
		麻しん・風しん(MR)	生	○						①						② (注2)				② (中学1年)	② (高校3年)	
		日本脳炎	不活化	○									① ②	③	(7.5歳まで)				④(9～12歳)			
		DT(二種混合)	不活化	○																①	(11～12歳)	
任 意 接 種	促子宮頸がんの緊急ワクチン	ヒブ (インフルエンザ菌b型)	不活化	○	①	②	③		④						(注3)							
		小児用肺炎球菌	不活化	○	①	②	③		④						(注3)							
		子宮頸がん予防ワクチン (HPV)	不活化	○																	①②③(注4)	
		B型肝炎	不活化		①	②			③													
		ロタウイルス	生		①	②			(注5)													
		インフルエンザ	不活化												①、②(毎年、流行前の10月～11月などに)					①(13歳より)		
		水痘	生							①												
	おたふくかぜ	生							①													
	A型肝炎	不活化																			①②③ (16歳以降 3回接種)	

- 注1 医学的な理由により生後6カ月未満までに接種できなかった者に限る
- 注2 5歳以上7歳未満で小学校就学前1年間にあるもの
- 注3 初回接種年齢によって、接種回数、接種間隔が異なる
- 注4 ワクチンごとに接種間隔が異なる
サーバリックスの場合、①-②は1カ月、②-③は5カ月空ける。ガーダシルの場合、①-②は2カ月、②-③は4カ月空ける
- 注5 生後6週から接種が可能。生後24週までに2回接種。生後24週を超えての接種は不可

摘 要	 …接種推奨年齢
	 …接種可能年齢