

体外衝撃波結石破碎術受けられる方へ

様

月日	入院・当日		1日目・退院
経過	処置前	処置後	/
	/		
処置	<p>☆治療時刻は [         ] の予定です</p> <p>治療15分前に排尿をすませて下さい 排尿後に痛みを予防の為、坐薬を使用します (喘息の既往・ポルタレン坐薬にアレルギーのある方は、お知らせください)</p>		医師の診察があります
検査			
安静	手術前は病室でお待ちください	特に制限はありません	
食事	<p>治療の3時間前(         )時から食事は食べられません</p> <p>・治療の2時間前(         )時から水分は飲みません</p>	<p>気分が優れないなどの症状が無ければ、帰室後より飲食できます</p> <p>病院食は夕食からの提供となります</p> <p>昼食は売店やレストランの使用をお願いいたします</p>	
治療・薬剤	<p>当日朝の内服薬は(あります/ありません)</p> <p>指示がある内服薬</p>	<p>手術室で腕に点滴が挿入されます</p> <p>点滴終了後針を抜きます</p> <p>普段飲んでいる薬は通常通り飲んで頂いて構いません</p> <p>夕食後より抗生剤の内服をします</p>	抗生剤の内服は、飲みきり終了です
清潔	自宅で入浴をすませて来て下さい		
排泄	記録表を使用し尿量を記載します 排石の有無を確認する為、尿を濾します	処置後、最初の尿は看護師が量や色などを確認しますので、お知らせください	
その他	<p>治療の流れを説明します</p> <p>*処置に対して承諾された同意書がある場合、病院提出分を看護師にお渡しください</p> <p>貴重品はセーフティーボックスに入れ、鍵はご家族にお預けください</p>	<p>処置後、尿が出づらい感じや痛みがあった場合、看護師までお知らせ下さい</p> <p>結石が出ましたら看護師までお知らせ下さい</p> <p>処置後は血尿がでます</p> <p>血尿を薄めたり、排石を促すために、処置後は水分をたくさん飲んで下さい(1日2Lが目安です)</p>	水分は控えず、積極的に摂取するようにしてください 状態が落ち着いていれば退院です 退院後の生活に制限はありません

※退院までの経過には個人差があります。この治療計画通りには経過しないこともありますので、ご了承ください。 千葉県立青葉病院