

# 千葉県感染症発生動向調査情報

2011年 第13週 (3/28-4/3) の発生は？

## 1 定点報告対象疾患(五類感染症)

報告のあった定点数		13週	12週	11週	10週
	小児科	15	15	13	15
	眼科	4	4	2	2
上段:患者数	インフルエンザ*	25	23	19	24
下段:定点あたり患者数	基幹定点	1	1	1	1

定点	感染症名	千葉県				千葉県 3/21-3/27 12週	
		注意報	3/28-4/3	3/21-3/27	3/14-3/20		3/7-3/13
			13週	12週	11週		10週
小児科	RSウイルス感染症		0	0	1	0	6
	咽頭結膜熱		1	1	0	4	26
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		20	14	23	22	207
	感染性胃腸炎		62	47	70	111	610
	水痘		17	13	17	22	213
	手足口病		1	0	0	0	8
	伝染性紅斑	○	12	6	9	9	54
	突発性発しん		9	7	11	9	48
	百日咳		0	0	0	0	11
	ヘルパンギーナ		0	0	0	0	1
	流行性耳下腺炎	↓	19	22	23	16	78
インフル	インフルエンザ*(高病原性鳥インフルエンザ*を除く)		120	194	386	490	1,686
眼科	急性出血性結膜炎		0	0	0	0	1
	流行性角結膜炎		0	3	0	0	19
基幹定点	細菌性髄膜炎 (髄膜炎菌性髄膜炎を除く)		0	0	0	0	0
	無菌性髄膜炎		0	0	0	0	1
	マイコプラズマ肺炎		0	0	1	0	0
	クラミジア肺炎 (オウム病を除く)		0	0	0	1	0

★★:流行中 ★:やや流行中 ◎:増加 ○:やや増加 →:変化なし ↓:やや減少 ↓↓:減少

## 2 全数報告対象疾患(5件)

病名	性	年齢層	診断(検査)方法	病名	性	年齢層	診断(検査)方法
結核	男性	40最大	放出インターフェロγ 試験	結核	女性	20歳代	放出インターフェロγ 試験
結核	男性	50歳代	画像診断等	結核	女性	20歳代	放出インターフェロγ 試験
結核	男性	60歳代	画像診断等	—	—	—	—

\*結核5件(80)の報告があった。

( )内は2011年累積件数

※ 累積件数は速報値であり、データが随時訂正されるため変化します。

## 定点当たり報告数 第13週のコメント

＜伝染性紅斑＞前週より増加し0.80となった。過去5年間の同時期と比べると最多。

＜流行性耳下腺炎＞前週より更に減少し1.27となったが、過去5年間の同時期と比べると最多。


### ＜伝染性紅斑＞

伝染性紅斑は、小児を中心にしてみられるヒトパルボウイルスB19による流行性発疹性疾患で、多くは飛沫または接触により感染します。成人は不顕性感染が多いとされています。両頬がリンゴのように赤くなることから、「リンゴ病」と呼ばれることもあります。

5～9歳での発生が最も多く、次いで0～4歳が多いとされていますが、成人でも病院内における集団感染事例の報告もあります。年始から7月上旬頃にかけて症例数が増加し、9月頃に最も少なくなる季節性を示しますが、流行が小さい年では、はっきりした季節性が認められないこともあります。

潜伏期間は10～20日で、頬に境界鮮明な紅い発疹が現れ、続いて手・足に発疹が現れます。胸・腹・背部にもこの発疹が出現することがあります。これらの発疹は1週間前後で消失しますが、長引いたり、一度消えた発疹が短期間のうちに再び出現することもあります。頬に発疹が出現する7～10日くらい前に、微熱や風邪のような症状が見られることが多く、この時期にウイルスの排泄量が多いため感染しやすくなります。発疹が現れたときにはウイルスの排泄はほとんどなく、感染力はほぼ消失しています。

2011年第12週現在では宮崎県、山形県、北海道の順で発生が多く見られています。千葉市では、今冬期においては例年に比べ高目で推移しており、第13週は前週より増加し0.80となり、過去5年間の同時期としては最多となっています。



### ＜流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)＞

2011年第12週現在は、長野県、香川県、鹿児島県の順で発生が多くなっています。千葉市では第13週では前週より減少し1.27となりましたが、過去5年間の同時期としては第7週から連続して最多となっています。

流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)は2～3週間の潜伏期(平均18日前後)を経て発症し、片側あるいは両側の耳の近くが腫れることを特徴とするウイルス感染症です。接触、又は飛沫感染で伝播し、感染力はかなり強いとされています。

唾液腺の腫脹・圧痛、嚥下痛、発熱を主症状として発症し、通常1～2週間で軽快します。感染しても症状が現れない不顕性感染も多く認められます。腫脹のほとんどは耳下腺で認められますが、顎下腺、舌下腺にも認められることがあります。合併症の多くは髄膜炎で、その他に、睾丸炎、卵巣炎などを認める場合があります。また、頻度は少ないですが、難聴や聾炎は重い合併症の一つです。

効果的に予防するにはワクチンが唯一の方法ですが、患者との接触当日に緊急ワクチン接種を行っても、症状の軽快が認められるのみで発症を予防することは困難であると言われています。集団生活に入る前にワクチンで予防しておくことが、最も有効な感染予防法です。

