

第6節 周産期死亡統計

表6-1 周産期死亡数、区別

令和元年

	周産期死亡数			周産期死亡率 1) (出産千対)	妊娠満22週 以後の死産率 1) (出産千対)	早期新生児 死亡率 (出生千対)	周産期死亡中 妊娠満22週以後の 死産の占める割合 (%)
	総数	妊娠満22週 以後の死産数	早期新生児 死亡数				
千葉市	20	19	1	3.2	3.1	0.2	95.0
中央区	6	5	1	3.8	3.2	0.6	83.3
花見川区	2	2	-	1.8	1.8	-	100.0
稲毛区	4	4	-	4.1	4.1	-	100.0
若葉区	1	1	-	1.1	1.1	-	100.0
緑区	7	7	-	7.1	7.1	-	100.0
美浜区	-	-	-	-	-	-	-

注: 1) 出産 = 出生 + 妊娠満22週以後の死産

表6-2 周産期死亡数、死因(児側病態)別

令和元年

	周産期死亡数			周産期死亡率 1) (出産千対)	妊娠満22週 以後の死産率 1) (出産千対)	早期新生児 死亡率 (出生千対)
	総数	妊娠満22週 以後の死産数	早期新生児 死亡数			
総数	20	19	1	3.2	3.1	0.2
XVI 周産期に発生した病態(P00-P04除く)	18	18	-	2.9	2.9	-
P05-P08 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	1	1	-	0.2	0.2	-
P10-P15 出産外傷	-	-	-	-	-	-
P20-P29 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	-	-	-	-	-	-
P35-P39 周産期に特異的な感染症	-	-	-	-	-	-
P50-P61 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	-	-	-	-	-	-
P70-P74 胎児及び新生児に特異的な一過性の内分泌障害及び代謝障害	-	-	-	-	-	-
P75-P78 胎児及び新生児の消化器系障害	-	-	-	-	-	-
P80-P83 胎児及び新生児の外皮及び体温調節に関連する病態	-	-	-	-	-	-
P90-P96 周産期に発生したその他の障害	17	17	-	2.7	2.7	-
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	2	1	1	0.3	0.2	0.2
Q00-Q07 神経系の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q10-Q18 眼、耳、顔面及び頭部の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q20-Q28 循環器系の先天奇形	1	-	1	0.2	-	0.2
Q30-Q34 呼吸器系の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q35-Q37 唇裂及び口蓋裂	-	-	-	-	-	-
Q38-Q45 消化器系のその他の先天奇形	1	1	-	0.2	0.2	-
Q50-Q56 性器の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q60-Q64 尿路系の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q65-Q79 筋骨格系の先天奇形及び変形	-	-	-	-	-	-
Q80-Q89 その他の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q90-Q99 染色体異常、他に分類されないもの	-	-	-	-	-	-
I 感染症及び寄生虫症	-	-	-	-	-	-
II 新生物	-	-	-	-	-	-
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	-	-	-	-	-	-
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	-	-	-	-	-	-
V 精神及び行動の障害	-	-	-	-	-	-
VI 神経系の疾患	-	-	-	-	-	-
VII 眼及び付属器の疾患	-	-	-	-	-	-
VIII 耳及び乳様突起の疾患	-	-	-	-	-	-
IX 循環器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X 呼吸器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X I 消化器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	-	-	-	-	-	-
X III 筋骨格系及び結合組織の疾患	-	-	-	-	-	-
X IV 尿路性器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X VII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	-	-	-	-	-	-
X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	-	-	-	-	-	-
X X 傷病及び死亡の外因	-	-	-	-	-	-

注: 1) 出産=出生+妊娠満22週以後の死産