地質柱状図 (No. 1)

調査件名 仮称千葉市都賀地区コミュニティーセンター地質調査委託

調査場所 千葉市貝塚町 1221番地

調査期間 自. 昭和 57年 1月 30日. 至 2月 1日

現場担当者

標高 T.P. ±0Mより −1.630 M

水位 (~~自然~~・孔内) 10.30 M

月日	標尺 (m)	標高 (m)	深度 (m)	層厚 (m)	地質記号	色調	地質名	観察記事	相対密度	標準貫入試験 深度 (m)	打撃数 回/cm	10cm毎の打撃回数 回/10cm 10	20	30	N値 (回)	採取深度 不攪乱資料 (m)
	0	1.630														
	1	2.73	1.10	1.10		茶褐	ローム	含水分中位 粘質分少し.								
	2	4.53	2.90	1.80		乳灰 乳黄灰	凝灰質粘土	粘質分多く火山灰多量含むが火山灰質分少量混入。	軟中	1.15 1.45	3/46	1/15	1/13	1/8		
	3									2.15 2.48	5/33	1/9	2/4	2		
	4						細砂		中	3.15 3.45	12/30	4	6	7		
	5							上部にシルト等状に少量挟む. 粘分量減入。	中密	4.15 4.45	12/30	3	4	5		
	6								中	5.15 5.45	30/30	7	10	13		
	7	8.63	7.00			日吉黄褐				6.15 6.45	21/30	9	8	4		
	8					日吉黄褐灰			密	7.15 7.45	30/30	3	7	20		
	9								極密	8.15 8.32	50/17	23	27/7			
	10									9.15 9.31	50/16	25	25/6			
	11							粘土分一寸雲母少量混入		10.15 10.44	50/29	12	19	19/9		
	12								密	11.15 11.45	33/30	8	12	13		
	13							1.00以深中粒砂少量含水多く日吉黄褐に変色する.		12.15 12.45	31/30	7	10	14		
1.00	14								中	13.15 13.45	34/30	10	10	14		
	15							含水分小位で全般に深度につれ牛角々ルーズで赤し.		14.15 14.45	35/30	9	12	14		
	16									15.15 15.45	31/30	8	10	13		
	17					日吉黄褐灰	細砂			16.15 16.45	21/30	5	7	9		
	18	15.73	18.10	15.20						17.15 17.45	25/30	5	7	12		
	19							含水分特に多く. 雲母少量貝殻片多量混入し全般に緩い.	極密	18.15 18.39	50/24	12	23	15/4		
	20									19.15 19.50	50/15	30	40/5			
	21	22.43	20.80	2.70		日吉黄灰	中砂			20.15 20.45	50/20	21	29			
	22									21.15 21.34	50/19	24	26/9			
	23							雲母少量混入 半分全般に緩い.	極密	22.15 22.38	50/23	19	22	9/3		
	24								中密	23.15 23.39	50/24	18	21	11/4		
2.1	25	27.08	25.45	4.65+		日吉黄灰	細砂			24.15 24.45	26/30	4	8	12		
	26									25.15 25.45	37/30	11	11	15		
	27															
	28															
	29															
	30															
	31															
	32															

地質柱状図 (No. 2)

調査件名　仮称千葉市都賀地区コミュニティーセンター地質調査委託

調査場所　千葉市貝塚町1.221番地

調査期間　自.昭和 57年 2月2日. 至 2月4日

現場担当者

標高　±0. M

水位（自然・孔内）　— 11.95 M

月日	標尺 (m)	標高 (m)	深度 (m)	層厚 (m)	地質記号	色調	地質名	観察記事	相対密度 稠度	標準貫入試験 深度 (m)	打撃数 回/cm	10cm毎の打撃回数 回/10cm 10	20	30	N値 (回)	採取不撹乱資料 深度 (m)
	0	±0														
	1							含水分小位. 均質なローム で粘質分 少量含む.	軟	1.15 1.48	4/33	1	11/9	21/4		1.10 1.80
	2	2.60	2.60	2.60		茶褐	ローム		軟	2.15 2.46	4/31	11/9	11/8	21/14		
	3					乳黄灰		含水分中位. 粘質分多量含む. 火山灰質 ブロックが分少量 混入.	中	3.85 4.15	5/30	11/9	21/11	2		3.00 3.70
	4	4.70	4.70	2.10		乳灰	凝灰質粘土		中	4.20 4.52	5/32	11/9	21/11	2		
	5								中	5.15 5.45	25/30	6	9	10		
	6						細砂	上部にシルト質状 少量挟む. 含水分小位で 雲母少量混入.		6.15 6.45	17/30	6	5	6		
	7									7.15 7.45	15/30	4	6	5		
2.2	8									8.15 8.45	10/30	4	3	3		
	9	9.00	9.00			黄褐			中	9.15 9.44	50/29	14	17	19/9		
	10					黄褐灰			密	10.15 10.39	50/24	12	24	12/4		
	11									11.15 11.34	50/19	24	26/9			
	12									12.15 12.49	50/30	11	12	17		
	13									13.15 13.45	32/30	8	12	12		
	14							粒子均一で雲母少量 混入 含水分小位 全体に多湿 下部灰白ブロック 状となる.		14.15 14.45	33/30	10	11	12		
	15									15.15 15.45	32/30	9	11	12		
	16									16.15 16.45	20/30	4	7	9		
	17									17.15 17.45	30/30	8	9	13		
	18	18.00	18.00						中 密	18.15 18.45	16/30	4	5	7		
	19	19.50	19.50	14.80		黄褐	細砂	雲母多く中粒砂少量 混入		19.15 19.45	34/30	6	9	19		
	20								密	20.15 20.30	50/15	28	22/5			
	21									21.15 21.29	50/14	31	19/4			
2.3	22							含水分特に多く 貝未片 多量. 雲母少量混入し 全体に多湿する.	密 — 極密	22.15 22.32	50/17	24	26/9			
	23	23.05	23.05	4.55		黄灰	中砂			23.15 23.35	50/20	33	27			
	24							含水分小位 粒ぞろい 雲母少量混入し 全体にも湿.	極密	24.15 24.34	50/19	26	24/9			
2.4	25	25.41	25.41	2.36+α		黄褐灰	細砂			25.15 25.41	50/26	14	19	17/6		
	26															
	27															
	28															
	29															
	30															
	31															
	32															
	33															